

MATEMATIČKA ANALIZA 1

Pismeni ispit – 27. siječnja 2024.

Zadatak 1. (*ukupno 24 boda*)

(a) (16 bodova) Odredite prirodnu domenu funkcije zadane formulom:

$$f(x) = \arcsin \left(\ln \left(\frac{1}{x} \right) - \frac{1}{2} \right).$$

(b) (8 bodova) Pronađite primjer funkcije čija je prirodna domena skup $\mathbb{R} \setminus \sqrt{2}\mathbb{Z}$.

Rješenje.

(a) Kako je $\mathcal{D}(\ln) = (0, \infty)$, mora biti $\frac{1}{x} > 0$, odnosno $x > 0$ (čime smo odmah dobili i da je $\frac{1}{x}$ dobro definirano). Nadalje, kako je $\mathcal{D}(\arcsin) = [-1, 1]$, treba vrijediti

$$-1 \leq \ln\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{2} \leq 1 \iff -\frac{1}{2} \leq \ln\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{3}{2} \iff e^{-\frac{1}{2}} \leq \frac{1}{x} \leq e^{\frac{3}{2}} \iff e^{-\frac{3}{2}} \leq x \leq e^{\frac{1}{2}}.$$

Dakle, $\mathcal{D}(f) = [e^{-\frac{3}{2}}, e^{\frac{1}{2}}]$.

(b) Promotrimo funkciju s pravilom pridruživanja

$$g(x) = \frac{1}{\sin\left(\frac{\pi x}{\sqrt{2}}\right)}.$$

Kako bi vrijednost funkcije g u točki x bila dobro definirana, treba biti $\sin\left(\frac{\pi x}{\sqrt{2}}\right) \neq 0$, odnosno $\frac{\pi x}{\sqrt{2}} \notin \pi\mathbb{Z}$, tj. $x \notin \sqrt{2}\mathbb{Z}$. Dakle, $\mathcal{D}(g) = \mathbb{R} \setminus \sqrt{2}\mathbb{Z}$.

Zadatak 2. (ukupno 26 bodova)

(a) (14 bodova) Niz (a_n) zadan je rekurzivno na sljedeći način:

$$a_1 = 0, \quad a_{n+1} = \frac{2a_n + 1}{a_n^2 + 2}.$$

Konvergira li niz (a_n) ? Ako konvergira, odredite mu limes.

(b) (12 bodova) Odredite sva gomilišta niza (x_n) zadanog s

$$x_n = \cos\left(\frac{(2n^2 + 1)\pi}{3n}\right).$$

Rješenje.

(a) Uočimo da za svaki n vrijedi

$$1 - a_{n+1} = 1 - \frac{2a_n + 1}{a_n^2 + 2} = \frac{(a_n - 1)^2}{a_n^2 + 2} \geq 0,$$

dakle niz (a_n) omeđen je odozgo s 1. Nadalje, za svaki n imamo

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2a_n + 1}{a_n^2 + 2} - a_n = \frac{1 - a_n^3}{a_n^2 + 2} \geq 0,$$

dakle niz (a_n) je rastuć. Prema tome, niz (a_n) konvergira, stoga označimo $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Iz rekurzivne relacije slijedi

$$L = \frac{2L + 1}{L^2 + 2},$$

odakle rješavanjem dobivamo $L = 1$.

(b) Iz adicijskih formula imamo

$$x_n = \cos\left(\frac{2n\pi}{3} + \frac{\pi}{3n}\right) = \cos\left(\frac{2n\pi}{3}\right) \cos\left(\frac{\pi}{3n}\right) - \sin\left(\frac{2n\pi}{3}\right) \sin\left(\frac{\pi}{3n}\right).$$

Budući da je $|\sin(\frac{2n\pi}{3})| \leq 1$ te $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\frac{\pi}{3n}) = 0$, po teoremu o sendviču slijedi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{2n\pi}{3}\right) \sin\left(\frac{\pi}{3n}\right) = 0.$$

S druge strane, kako je

$$\cos\left(\frac{2n\pi}{3}\right) = \begin{cases} 1 & \text{ako je } n \text{ djeljiv s } 3 \\ -\frac{1}{2} & \text{inače} \end{cases}$$

te $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\frac{\pi}{3n}) = 1$, dobivamo da vrijedi

$$\lim_{m \rightarrow \infty} x_{3m} = 1, \quad \lim_{m \rightarrow \infty} x_{3m+1} = \lim_{m \rightarrow \infty} x_{3m+2} = -\frac{1}{2}.$$

Dakle, $-\frac{1}{2}, 1$ gomilišta su niza (x_n) . Dokažimo da su to ujedno sva gomilišta. Pretpostavimo da je x gomilište od (x_n) te odaberimo podniz $(x_{p_n})_n$ koji konvergira prema x . Tada postoji $j \in \{0, 1, 2\}$ takav da p_n daje ostatak j pri dijeljenju s 3 za beskonačno mnogo n . Drugim riječima, postoji daljnji podniz $(x_{p_{q_n}})_n$ takav da $p_{q_n} \equiv j \pmod{3}$ za sve n . No tada dobivamo

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{p_{q_n}} = \begin{cases} 1 & \text{ako } j = 0 \\ -\frac{1}{2} & \text{inače} \end{cases},$$

čime je tvrdnja dokazana.

Zadatak 3. (ukupno 24 boda)

- (a) (8 bodova) Postoji li konvergentan niz $(x_n)_n$ za koji niz $(\lfloor x_n \rfloor)_n$ ne konvergira?
- (b) (16 bodova) Dokažite da sljedeći limes postoji i odredite ga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \sum_{k=n}^{2n} k^4 \sin\left(\frac{1}{k}\right)$$

Rješenje.

- (a) Postoji. Promotrimo li niz $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$, vrijedi $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, ali

$$\lfloor x_n \rfloor = \begin{cases} 0, & n \in 2\mathbb{N} \\ -1, & n \in 2\mathbb{N} - 1 \end{cases}$$

pa zaključujemo da niz $\lfloor x_n \rfloor$ ne konvergira.

- (b) Koristimo Cesaro–Stolzov teorem. Budući da je niz $(n^4)_n$ strogo rastući i neograničen, definiramo li $a_n = \sum_{k=n}^{2n} k^4 \sin(\frac{1}{k})$ i $b_n = n^3$ i pokažemo li da postoji limes $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n}$, tada će postojati i limes $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ i oni će jednaki.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)^4 \sin(\frac{1}{2n+2}) + (2n+1)^4 \sin(\frac{1}{2n+1}) - n^4 \sin(\frac{1}{n})}{(n+1)^4 - n^4} \quad \frac{/n^3}{/n^3} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2 + \frac{2}{n})^3 \cdot \frac{\sin(\frac{1}{2n+2})}{\frac{1}{2n+2}} + (2 + \frac{1}{n})^3 \cdot \frac{\sin(\frac{1}{2n+1})}{\frac{1}{2n+1}} - n^3 \cdot \frac{\sin(\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}}}{4 + \frac{6}{n} + \frac{4}{n^2} + \frac{1}{n^3}} \\ &= \frac{8 + 8 - 1}{4} = \frac{15}{4}, \end{aligned}$$

gdje smo u posljednjoj jednakosti koristili limes $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ te teoreme o limesu zbroja, produkta i kvocijenta.

Zadatak 4. (ukupno 26 bodova)

(a) (16 bodova) Odredite postoji li sljedeći limes i ako postoji, izračunajte ga:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - e^{\frac{1}{x^2}} \cos \frac{1}{x} \right).$$

(b) (10 bodova) Postoji li neprekidna funkcija $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ koja nije ograničena i za koju postoji limes $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin(f(x))$?

Rješenje.

(a) Koristeći supstituciju limesa s predavanja i vježbi te teorem o limesu produkta i zbroja, vrijedi:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - e^{\frac{1}{x^2}} \cos \frac{1}{x} \right) &= \left| x \rightarrow \infty \implies y = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+ \right| \\ &= \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^{y^2} \cos y}{y^2} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0^+} \left(\frac{1 - \cos y}{y^2} + \cos y \cdot \frac{1 - e^{y^2}}{y^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

(b) Dokažimo da takva funkcija ne postoji. Kako funkcija nije ograničena, ona nije ograničena ili odozgo ili odozdo. Pretpostavimo, bez smanjenja općenitosti, da f nije ograničena odozgo budući da u suprotnom možemo promotriti funkciju $-f$ i iskoristiti identitet $\sin(-f(x)) = -\sin(f(x))$.

Označimo $f(0) = m$. Neka je $M \in \mathbb{R}$ proizvoljan realan broj za koji vrijedi $M > m$. Kako f nije ograničena odozgo, postoji $x_M \in \mathbb{R}$ takav da je $f(x_M) > M$ pa po teoremu o međuvrijednosti slijedi da funkcija na intervalu $[0, x_M]$ postiže sve vrijednosti u intervalu $[m, M]$ pa posebno znamo da je $[m, M] \subset f([0, \infty))$. Međutim, kako je $M > m$ bio proizvoljan, zaključujemo da je $[m, \infty) \subset f([0, \infty))$. To posebno znači da postoje niz brojeva $(x_n)_n$ takav da je $f(x_n) = \frac{\pi}{2} + (2n + 2m)\pi$ i niz brojeva $(y_n)_n$ takav da je $f(y_n) = -\frac{\pi}{2} + (2n + 2m)\pi$ (naime, za svaki $n \in \mathbb{N}$ su brojevi $\pm \frac{\pi}{2} + (2n + 2m)$ su veći od m).

Tvrdimo da niz $(x_n)_n$ ima strogo rastuć i neomeđen podniz. Naime, po teoremu s predavanja slijedi da on ima monoton podniz. Kad bi on imao neki padajući podniz $(x_{n_k})_k$, zbog toga što je omeđen odozdo s 0, on bi imao limes $L \geq 0$, ali tada bi zbog neprekidnosti funkcije vrijedilo:

$$+\infty > f(L) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2} + (2n_k + 2m)\pi = +\infty,$$

što je kontradikcija. Dakle, bilo koji monoton podniz niza $(x_n)_n$ mora biti rastuć, ali kako je dodatno $f(x_m) \neq f(x_n)$ za sve $m \neq n$, zaključujemo da je i $x_m \neq x_n$, tj. svi elementi niza $(x_n)_n$ su različiti pa zaključujemo da su i svi elementi monotonog podniza različiti pa je taj podniz $(x_{n_k})_k$ strogo rastuć. Analogno se dokaže i da postoji strogo rastuć i neomeđen podniz $(y_{n_k})_k$. Međutim, kako je

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sin(f(x_{n_k})) = \lim_{k \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{\pi}{2} + (2n_k + 2m)\pi\right) = 1 \neq -1 = \lim_{k \rightarrow \infty} \sin\left(-\frac{\pi}{2} + (2n_k + 2m)\pi\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \sin(f(y_{n_k})),$$

našli smo dva niza koja konvergiraju k $+\infty$, za koje su limesi funkcija različiti pa zaključujemo da funkcija $\sin(f(x))$ nema limes u $+\infty$.